

← 開封口

第2類医薬品

セルフメディケーション  
税 控除対象

# Akubi Girl®

©タツノコプロ



## アキビちゃん せきどめシロップs

製造販売元  
中北薬品株式会社  
愛知県津島市白浜町字番場52-1



### 【効能・効果】

- せき、たん  
【用法・用量】  
5才以上8才未満……………1回 10mL  
3才以上5才未満……………1回 7.5mL  
1才以上3才未満……………1回 6mL  
3カ月以上1才未満……………1回 3mL  
3カ月未満……………服用しないでください  
1日3回食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、約4時間の間隔をおいていただければ1日6回まで服用できます。  
＜用法・用量に関する注意＞  
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  
(2)2才未満の乳幼児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。  
(3)用法・用量を厳守してください。

### 【成分・分量】1日量(60mL中)

有効成分	含量	はたらき
デキストロトルファン 臭化水素酸塩水和物	20mg	せき中枢に働き、せきを しずめます。
グアイフェネシン	100mg	気道粘膜に働いて、たん を溶かしやすくなります。
クロムフェニラン マレイン酸塩	4mg	炎症に伴うせきをし ずめます。

添加物として、白糖、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸、安息香酸ナトリウム、パラベン、プロピレングリコール、香料を含む。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### 【お問い合わせ先】

- 購入した薬局・薬店
- 中北薬品株式会社 製薬工場事業部  
電話：0567-32-1431  
受付時間：9時から17時まで  
(土、日、祝日及び弊社指定休日を除く)

### 副作用被害救済制度

☎0120-149-931

### 安全キャップの使用方法

- 安全キャップの取り付け方  
①付属の計量カップ及び安全キャップを外してから、キャップをあけてください。
- 安全キャップのあけ方  
①キャップを強く押しながら②矢印の方向に回してあげます。



第2類医薬品

# アキビちゃん せきどめ



## アキビちゃん せきどめシロップs

3ヶ月以上8才未満

120mL

2024年5月作成(第1版)

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保存してください。

第2類医薬品 鎮咳去痰薬

販売名:アキビちゃんのこどもせきどめシロップS

【特徴】

「アキビちゃんのこどもせきどめシロップS」は3カ月から8才未満のお子さま用のせき止めシロップです。せきを鎮め、たんの切れをよくします。

### ⚠️ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

### ❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 次の方は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
  3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがある。)

### ■ 相談すること

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4)次の症状のある人。 高熱、排尿困難  
(5)次の診断を受けた人。 緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

また下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみじんましん、声のかすけ、しゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青さ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える。疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりやすくなる。血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の特続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気
4. 5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号:

使用期限:

